

**Uw naam:**

---

---

**Naam van arts**

**(die filgotinib heeft voorgeschreven):**

---

---

**Telefoonnummer van arts:**

---

---

**De datum waarop u begon met filgotinib:**

---

---

Jyseleca-PAC-v3.0-01-2023

### **Meer informatie**

Wilt u meer informatie over uw medicijn? Lees de bijsluiter of scan de QR-code voor het online materiaal. Ga met vragen over uw medicijn of bijwerkingen naar uw arts of apotheker.

Deze informatie is ook terug te vinden op [www.jyseleca.eu](http://www.jyseleca.eu) via het scannen van de QR-code [www.jyseleca.eu](http://www.jyseleca.eu)



Dit materiaal is goedgekeurd door het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen ([www.cbg-meb.nl](http://www.cbg-meb.nl)).

## **Patiëntkaart**

Let op bij gebruik van **Jyseleca®** (filgotinib). Filgotinib is het werkzaam bestanddeel in het medicijn.

Draag deze kaart altijd bij u en laat deze kaart zien aan elke zorgverlener die betrokken is bij uw zorg of behandeling, zoals een apotheker of spoedarts.

Deze kaart bevat belangrijke informatie voor patiënten over de veiligheid van filgotinib. Lees de bijsluiter voor meer informatie.



## Infecties

- Filgotinib kan een bestaande infectie verergeren of uw kans op een nieuwe infectie vergroten. Vertel het uw arts meteen als u ziek wordt of verschijnselen merkt van een infectie, zoals:
  - koorts of koude rillingen, kortademigheid, hoesten, vermoeider voelen dan normaal - dit kunnen tekenen zijn van een longontsteking
  - koorts, zweten, gewichtsverlies of een hoest die niet weggaat - dit kunnen tekenen zijn van tuberculose (tbc)
  - een pijnlijke huiduitslag met blaren - dit kan een teken zijn van gordelroos (herpes zoster)
- Vraag uw arts voordat u met filgotinib begint of u getest moet worden op tbc, waaronder inactieve infecties
- Vertel het uw arts als u onlangs in nauw contact bent geweest met een persoon met tbc

## Bloedstolsels in de aderen van uw been of longen

- Vertel het uw arts meteen als u symptomen krijgt van bloedstolsels in uw benen of longen, zoals een pijnlijk gezwollen been, pijn op de borst of kortademigheid

## Cholesterol

- Een hoog cholesterolgehalte is een belangrijke risicofactor voor hartaandoeningen. Terwijl u filgotinib inneemt, zal uw arts uw cholesterolgehalte controleren. Dit zal helpen beslissen of u een behandeling nodig heeft om uw cholesterolgehalte te verlagen

## Vaccins

- U mag bepaalde (levende) vaccins niet krijgen (bijvoorbeeld Zostavax™, een middel ter voorkoming van gordelroos) wanneer u filgotinib inneemt
- Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u filgotinib inneemt. Mogelijk willen zij controleren of al uw vaccinaties in orde zijn

## Zwangerschap, anticonceptie en borstvoeding

- Filgotinib mag niet tijdens de zwangerschap worden ingenomen
- Gebruik effectieve anticonceptiemiddelen terwijl u filgotinib inneemt en gedurende 1 week na inname van uw laatste dosis
- Als u zwanger wordt terwijl u filgotinib inneemt of denkt dat u mogelijk zwanger bent, stop dan met de inname van filgotinib en raadpleeg onmiddellijk uw arts
- Praat eerst met uw arts als u van plan bent om zwanger te worden
- Geef geen borstvoeding terwijl u filgotinib inneemt

## Kanker en Huidkanker

- JYSELECA® kan leiden tot een verhoogd risico op kanker. Vertel het uw arts als u nieuwe huidlaesies ontdekt.

## Hartziekte

- JYSELECA® kan leiden tot een verhoogd risico op bepaalde hartziekten. Vertel het uw arts als u last krijgt van pijn op de borst (die zich kan uitbreiden naar armen, kaak, nek en rug), kortademigheid of duizeligheid.